

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES ®

## STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

Départements : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne



Ministère de l'Agriculture  
Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt  
**Service Régional de la Protection des Végétaux**  
62, avenue Nationale - La Neuville  
B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX  
Téléphone : 26.09.06.43

PUBLICATION PÉRIODIQUE

Abonnement annuel :

180 F

### ÉDITION - GRANDES CULTURES

ISSN 0295 - 5776

- 1 -

BULLETIN n° 38 du 24 MARS 1988

**COLZA** : INSECTES : reprise du vol de charançon de la tige et 1ère capture de méligèthe

MALADIES : cylindrosporiose en extension

**BLE** : INSECTES :  
- MOUCHE GRISE : dernière limite pour intervenir

- Dégâts de mouche jaune

MALADIES :

- Piétin-verse en extension

- Situation feuillage stationnaire

**ORGE** : Situation maladies

**POIS** : Désherbage et dépliant jaune

#### COLZA

Stades : Bienvenu : tige à 15-25 cm et boutons accolés.

Darmor et Jet Neuf : tige à 5-10 cm.

#### INSECTES

Le vol de charançon de la tige a repris le 20 mars dans de nombreux secteurs. Des pontes sont observées localement.

La variété Bienvenu arrive en fin de stade de sensibilité (tige à 20 cm).

Une intervention est à réaliser rapidement dans les parcelles où des captures sont enregistrées.

La 1ère capture de méligèthe a été enregistrée le 20 mars aux Rivières Henrue (51).

Traiter si vous observez 1 méligèthe par inflorescence au stade bouton accolé (D1-D2).

#### MALADIES

La cylindrosporiose est en extension sur Jet Neuf et à un moindre degré sur les autres variétés.

Assurer rapidement une protection sur les parcelles de Jet Neuf.

Le pseudocercospora est présent sur les feuilles basses de la variété Bienvenu.

Ne pas intervenir dans l'immédiat.

#### BLE

Stade épi à 1 cm à 1 noeud pour les plus précoces.

#### INSECTES

Les pénétrations de mouche grise s'accroissent.

C'est la dernière limite pour traiter les parcelles à risque.

P.1.4.3

Les dégâts de mouche jaune se manifestant par un noircissement de l'épi sont fréquents, surtout dans l'Aube. Il n'est pas rare d'observer 20 à 25 % d'épis détruits par ce parasite.

Les études menées depuis 3 ans n'ont pas permis de mettre en évidence la nuisibilité de ce parasite.

#### MALADIES

Les niveaux d'attaque en piétin-verse varient de 0 à 30 % de maitres brins touchés.

Les maladies du feuillage sont stationnaires, voire en légère régression du fait de la disparition des feuilles les plus âgées. Aucun foyer de rouille jaune n'a été signalé dans la région.

Parcelles avec 15 à 20 % de pieds touchés par le piétin-verse : traiter dès que possible, même si le stade 1 à 2 noeuds n'est pas atteint. Une application plus tardive avec un niveau d'attaque plus élevé risque de provoquer une chute importante d'efficacité.

La protection du feuillage, dans ces parcelles à 1er traitement précoce, devra sans doute être avancée.

Parcelles à risque piétin n'ayant pas atteint le seuil de 15 à 20 % de pieds touchés Attendre le stade 1 à 2 noeuds pour intervenir, même en absence de symptômes.

#### ORGE

Rhynchosporiose et Helminthosporiose sont fréquentes.

La stratégie de protection contre les maladies de l'orge repose sur 2 traitements systématiques : le 1er au stade 1 à 2 noeuds, le 2ème à la sortie des barbes.

Il est encore trop tôt pour intervenir.

#### POIS

##### DESHERBAGE

Les semis de pois sont déjà bien avancés.

Après le retrait de certaines formulations de dinosèbe (Aretit et Phénotan), le désherbage de post-semis prélevée voit renouveler son intérêt.

En situation très infestée de graminées, préférer les antigaminées spécifiques de post levée (voir le dépliant jaune).

DEPLIANT JAUNE ITCF - UNIP - SPV - FNAMS

#### INRA

Conservez-le ! Nous y ferons référence pendant toute cette campagne.



Pour profiter des informations par MINITEL,  
appeler directement le n° 36.15 et faire le code  
CLACMAG ou INFOCA

votre n° d'abonné à rappeler  
en cas de réclamation

DUPOJ	01
MR DUPONT Jean	
1 Grande Rue	
51100 REIMS	